



VIATORAZ 76 WP

Registro Nacional ICA N° 986

Fungicida con actividad por contacto y sistémica local que presenta acción preventiva y curativa específicamente en hongos Oomicetos. Combina dos ingredientes activos con diferente mecanismo de acción: Propineb, fungicida carbamato con prolongada actividad residual y mecanismo de acción multicitado y Cymoxanil, fungicida del grupo denominado Cianoacetamida oxima con acción translaminar que previene el desarrollo y establecimiento del patógeno, destruyendo selectivamente el micelio, limitando la formación de conidias y reduciendo su poder germinativo.

Tipo de producto	Fungicida Agrícola
Formulación	Polvo Mojable-WP
Ingrediente activo	Propineb + Cymoxanil
Concentración	700 g/kg + 60 g/kg
Categoría toxicológica	III - Ligeramente Peligroso
Cultivos	Papa
Presentación disponible	500 gr.



COMPOSICIÓN

INGREDIENTE ACTIVO

Propineb	700 g/kg
polymeric zinc propylenebis(dithiocarbamate) Cymoxanil.	60 g/kg
1-[(EZ)-2-cyano-2-methoxyiminoacetyl]-3-ethylurea	
Ingredientes aditivos.	c.s.p. 1 kg

RECOMENDACIONES DE USO

Cultivo	Malezas controladas	Dosis	P.C.	P.R.
Papa	Gota (Phytophthora infestans)	1.5 kg/Ha. Realizar una (1) sola aplicación por ciclo de cultivo	14 días	4 horas

P.C. Periodo de carencia. Intervalo de tiempo entre la última aplicación y la cosecha.

P.R. Periodo de Reingreso. Intervalo que debe transcurrir entre la aplicación y el reingreso de personas y animales al área o cultivo tratado.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar una (1) sola vez por ciclo de cultivo, dentro de un programa de manejo integrado de la enfermedad, en rotación con otros fungicidas de diferente mecanismo de acción o grupo químico para prevenir la aparición de resistencia. Aplicar foliarmente de manera preventiva cuando la incidencia de la enfermedad sea al menos del 5%, o cuando las condiciones ambientales favorezcan su desarrollo. Puede ser aplicado con cualquier equipo terrestre, pulverizadora manual, atomizadora o equipo tractorizado, siempre que se encuentre en un buen estado de funcionamiento y provisto de boquillas adecuadas (de tipo cono hueco). Use el volumen de agua requerido según el desarrollo del cultivo. **VIATORAZ 76 WP** debe ser aplicado con un volumen de agua que asegure una buena y uniforme cobertura del follaje. Se recomienda calibrar previamente el equipo de aplicación. Adicionar la dosis recomendada de **VIATORAZ 76 WP** en 1/4 del volumen de agua a aplicar, agitar bien hasta obtener una solución estable y agregar la cantidad de agua faltante. En caso de adicionar un surfactante no iónico, añádalo al final y continúe agitando la mezcla. Usar de 400 a 600 L/ha.

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD

En caso de requerirse mezcla con otro producto, se recomienda hacer una prueba a pequeña escala antes de la aplicación. Este producto no es fitotóxico cuando se utiliza a las dosis recomendadas en esta etiqueta.

INSTRUCCIONES DE MANEJO

- Llene el tanque hasta la mitad de su capacidad con agua, luego adicione la cantidad de producto según las dosis recomendadas anteriormente y agite con el fin de homogenizar el producto, luego complete el tanque con agua.
- Utilice agua limpia durante la aplicación y ajuste el pH del agua en caso de ser necesario.
- Agite la mezcla antes y durante la aplicación.
- Aplique con el volumen y la presión suficiente de tal manera que se asegure un buen cubrimiento.

PRECAUCIONES

- Lea la etiqueta antes de usar el producto.
- Mantenga el producto bajo llave fuera del alcance de los niños.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar los vapores.
- Puede ser nocivo para la salud si se ingiere.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante la manipulación, aplicación y/o para reingresar al área tratada antes de que se cumpla el periodo de reentrada.
- Después de usar el producto cámbiese y báñese con abundante agua y jabón.
- En caso no consumir la totalidad del producto, consérvelo en el envase original cerrado y etiquetado.






OBSERVACIONES AMBIENTALES



- Evite verter este producto por los canales de aguas lluvias o al suelo.
- Tóxico para organismos acuáticos.
- No lave los equipos de aplicación en las fuentes de agua.
- No contamine las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Después de hacer la aplicación lave los equipos y repase el cultivo con el agua de lavado. No vierta los residuos en fuentes de agua.
- En caso de derrame, recoja con material absorbente, y elimine de acuerdo a los procedimientos establecidos.
- No aplique cuando haya posibilidad de movimiento o escorrentía del producto en el suelo.
- No aplique cuando las condiciones ambientales favorezcan el arrastre de la aspersión hacia zonas no objetivo como canales, aguas corrientes o lagos.
- Para aplicación aérea y terrestre, respete las franjas de seguridad de 100 y 10 metros respectivamente con relación a los cuerpos de agua.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta el agua en la mezcla de aplicación, perfore el recipiente y entregue a "Campo Limpio", nuestro Programa de manejo responsable de envases vacíos.



MANEJO DEL PRODUCTO



APLICACIÓN DEL PRODUCTO



EMERGENCIAS

Emergencias toxicológicas 24 Cisproquim 018000 916012 fuera de Bogotá.
En Bogotá comunicarse al teléfono (+57)1 288 6012.

La información contenida en este documento no exonera de la lectura de la etiqueta y datos de seguridad correspondientes del producto.